


Tilstand	Symptomer	Når kan det returnere til barnehagen?	Andre tiltak
Feber	Temperatur over 38 på kvelden eller over 37,5 om morgenen	Barnet bør holdes hjemme til det er feberfritt, kan komme i barnehagen dagen etter feberfrihet.	
Diare med el uten brekninger	Akutte diaretilstander uten kjent årsak med eller uten feber	Kan returnere til barnehagen 48 timer etter symptomfrihet	
Oppkast uten kjent årsak	Oppkast med el uten magesmerter og feber	Kan returnere til barnehagen 48 timer etter symptomfrihet	
Norovirus	Diare, oppkast, ofte magesmerter	Kan returnere til barnehagen 48 timer etter symptomfrihet.	Forebygge smitte ved håndvask med såpe og vann! Alkoholbasert hånddesinfeksjon ikke godt nok. Hyppig vask av stellebord og leker.
Mild til moderat øyekatarr	Noe puss, men ikke kraftig rødhet på det hvite i øyet	Kan være i barnehagen, ikke behov for medisiner	Håndhygiene.
Kraftig øyekatarr	Hissig rødhet i øyet, rikelig puss dannelse og kløe/smerter	Bør oppsøke lege for behandling. Kan komme i barnehagen dagen etter oppstart av behandling	
Forkjølelse	Snue, snørrdannelse, nesetetthet, hoste	Kan gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det.	
Hoste	Hoste uten feber er stort sett forkjølelse.	Kan gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det	Ved langvarig hoste bør barnet til lege: obs astma og kikhoste
Kikhoste	Kikende hoste, ofte i hosteanfall	Diagnose settes av lege. Kan returnere til barnehagen 3-5 dager etter påbegynt behandling.	Kontakt kommuneoverlegen ved mer enn 2 tilfeller.
Ørebetennelse	Plutselig øreverk, feber og ofte forkjølelse	Kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.	
Brennkopper	Utslett med små blemmer med gul væske/sårsekret. Blir skorper.	Kan returnere i barnehagen når blemmene er tørre, eller tildekket slik at det gule sårsekretet ikke smitter over på andre.	Utbrudd ved fler enn 2 tilfeller. Hansker ved bleieskift. God håndhygiene.
Hodelus	Luseegg og lus i hodebunn, evt. kløe	Trenger ikke sendes hjem hvis det oppdages lus i barnehagetiden. Returnere til barnehagen så raskt som mulig etter påbegynt lusekur.	Skal ikke behandle barn som ikke har påvist lus.
Vannkopper	Små karakteristiske blemmer i huden. Kløe	Kan gå i barnehagen når utslettet er tørket inn	Gi informasjon om smitte. Skjerme ubeskyttede gravide.
Barnemark/spolmark	Små hvite mark rundt endetarmsåpningen og i avføringen. Særlig på kvelden like etter at barnet har lagt seg eller på morgenen. Analkløe.	Reseptfri behandling på apotek. Kan returnere til barnehagen etter igangsatt behandling. Hele familien behandles.	Hansker ved bleieskift. Håndhygiene. Ved flere tilfeller bør nedvask av stelleområde/toaletter vurderes.
MRSA	1.Kan påvises i sårsekret 2.Kan være symptomfri bærer	1.Ved MRSA i sår kan barnet returnere til barnehagen når det ikke er fare for smitte av sårsekret. 2.Ved bærerskap av MRSA kan barnet gå i barnehagen som vanlig.	Ikke anbefalt å informere barnehagen om påvist bærerskap av MRSA hos barn
Skabb	Kløende røde prikker (utslett), særlig på armer og ben på natten.	Barnet kan vende tilbake dagen etter igangsatt behandling. Hele familien behandles.	
Hånd-fot-munnsyke	Feber, redusert allmenntilstand, sår hals. Utslett/blemmer i munn, inni håndflater og på fotsåler.	Kan være i barnehagen så lenge allmenntilstanden tillater det. Smitter i starten like før og mens blemmene kommer.	God håndhygiene. Vanlig med utbrudd sommer/høst.

Ved påvisning av enkelte sykdommer er det **ikke** hensiktsmessig å holde barn hjemme av hensyn til smittevernet. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger tilbakeholdelse.



Barn kan gå i barnehagen så fremt allmenntilstanden er god ved disse sykdommene:  
  
(skal være feberfri, men kan ha utslett)



- Herpes simplex infeksjon (munnsår)
- Hånd-fot-munnsyke
- Mollusker
- Mononukleose (kysseyken)
- Loppebitt
- 4.barnesykdom
- 5.barnesykdom
- Vorter
- Parainfluenza
- RS-virus
- Atypiske mykobakterier